

Pour une installation dans les étables et locaux agricoles. Ce produit est un nettoyant désinfectant désodorisant de nettoyage général et de désinfection en une étape destiné à être utilisé sur les surfaces dures non poreuses.

Il nettoie rapidement en éliminant les saletés, la crasse, le sang, l'urine, les taches de moisissure, les matières fécales et d'autres salissures courantes présents dans les étables, les fermes et les véhicules de transport d'animaux.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur des surfaces dures et non poreuses : le chrome, la céramique émaillée, la porcelaine émaillée, les carreaux vernissés et l'acier inoxydable ainsi que sur des surfaces de contact fréquent : les planchers, les murs, les caisses et le matériel de transport d'animaux ou toute surface dure, non poreuse et lavable où une désinfection est requise. Il combat également les bactéries responsables des odeurs, laissant les surfaces propres et fraîches.

Les allégations

VIROCIDE en 1 minute, sauf indication contraire :

Coronavirus humain
Cytomégalovirus
Herpès virus simplex de type 1
Herpès virus simplex de type 2
Norovirus
Poliovirus de type 1 (souche Chat)
Réovirus aviaire
Rhinovirus de type 37
Rotavirus (souche WA)
Rotavirus porcin
SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19)
VIH de type 1
Virus de l'hépatite B du canard
Virus de l'hépatite B humain (VHB)
Virus de l'hépatite C humain (VHC)
Virus de l'herpès équin de type 1
Virus de la diarrhée épidémique porcine (VDEP)
Virus de la diarrhée virale bovine
Virus de la fièvre aphteuse (VFA) – 3 minutes
Virus de la grippe aviaire A (H3N2)
Virus de la grippe aviaire A (H7N9)
Virus de la grippe équine A (H3N8)
Virus de la grippe pandémique A H1N1
Virus de la grippe A
Virus de la grippe B
Virus de la maladie de Marek
Virus de la maladie de Newcastle
Virus de la parainfluenza de type 3
Virus de la pseudorange
Virus de la stomatite vésiculaire
Virus de la vaccine
Virus du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (VSDRP)
Virus respiratoire syncytial (VRS)

Efficacité prouvée contre le poliovirus de type 1, ce qui permet d'alléguer des propriétés virucides à large spectre contre la plupart des virus enveloppés et non enveloppés.

Ce produit a une efficacité démontrée contre le poliovirus de type 1 et est censé inactiver tous les virus de la grippe A.

Fiche de référence

Fabriqué par :

Virox Technologies Inc.

2770 Coventry Road, Oakville, ON Canada L6H 6R1
1 800 387-7578 | virox.com | viroxanimalhealth.com



BACTÉRICIDE en 1 minute :

Acinetobacter baumannii (Multirésistance aux médicaments (MDR))
Bordetella bronchiseptica
Bordetella pertussis
Burkholderia cepacia
Chlamydia psittaci
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae (New Delhi Metallo-β-lactamase 1 (NDM 1))
Enterococcus faecalis (résistant à la vancomycine (ERV))
Enterococcus faecium
Escherichia coli
Escherichia coli (Beta-lactamase à spectre étendu (BLSE))
Escherichia coli (New Delhi metallo-β-lactamase 1 (NDM-1))
Escherichia coli O157:H7
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae (résistant au carbapénème (CRE))
Klebsiella pneumoniae (Beta-lactamase à spectre étendu (BLSE))
Klebsiella pneumoniae (New Delhi metallo-β-lactamase 1 (NDM-1))
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Pasteurella multocida
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa (Metallo-β lactamase (MBL) positive)
Salmonella enterica
Serratia marcescens
Shigella dysenteriae
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus (résistant à la méthicilline (SARM))
Staphylococcus aureus (résistance intermédiaire à la vancomycine (VISA))
Staphylococcus aureus (résistant à la vancomycine (SARV))
Staphylococcus aureus, génotype résistant à la méthicilline acquis dans la communauté USA 400 (AC-SARM 400)
Staphylococcus epidermidis (résistant à la méthicilline (SERM))
Staphylococcus pseudintermedius
Stenotrophomonas (Pseudomonas) maltophilia
Streptococcus pneumoniae (résistant à la pénicilline (SPRP))
Streptococcus pyogenes

FONGICIDE en 1 minute :

Candida albicans
Microsporium canis
Trichophyton interdigitale

TUBERCULOCIDE en 1 minute :

Mycobacterium bovis (BCG)

ASSAINISSEMENT À LARGE SPECTRE D'ACTION en 10 secondes pour surfaces sans contact avec des produits alimentaires :

Acinetobacter baumannii
Campylobacter jejuni
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecalis (résistant à la vancomycine (ERV))
Escherichia coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus (résistant à la méthicilline (SARM))

ASSAINISSEMENT en 30 secondes pour surfaces au toucher doux :

Enterobacter aerogenes

Enterococcus faecalis (résistant à la vancomycine (ERV))

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (résistant à la méthicilline (SARM))

ANTIMOISSISSURE en 4 minutes :

Aspergillus brasiliensis

Mode d'emploi du désinfectant

LES SURFACES TRÈS SOUILLÉES DOIVENT ÊTRE NETTOYÉES AVANT D'ÊTRE DÉSINFECTÉES

Pour une utilisation comme nettoyant/désinfectant en une étape :

1. Pré-nettoyer les zones visiblement souillées.
2. Appliquer le produit sur les surfaces dures et non poreuses.
3. Les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 1 minute. Utilisez un temps de contact de 3 minutes pour le virus de la fièvre aphteuse (VFA).
4. Essuyer les surfaces pour les sécher ou les laisser sécher à l'air.

Pour une utilisation comme nettoyant et/ou désodorisant :

1. Appliquer le produit sur les surfaces.
2. Les laisser sécher à l'air ou les rincer.

Pour une utilisation comme assainisseur des surfaces sans contact avec des produits alimentaires :

1. Pré-nettoyer les zones visiblement souillées.
2. Appliquer le produit sur les surfaces dures et non poreuses jusqu'à ce qu'elles soient complètement mouillées.
3. Les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 10 secondes.
4. Essuyer les surfaces pour les sécher ou les laisser sécher à l'air.

Pour tuer les moisissures :

1. Pré-nettoyer les surfaces en suivant les instructions de nettoyage énumérées ci-dessus.
2. Appliquer le produit sur les surfaces dures et non poreuses, jusqu'à ce qu'elles soient visiblement mouillées.
3. Les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 4 minutes.
4. Essuyer les surfaces pour les sécher ou les laisser sécher à l'air.

Pour contrôler les moisissures :

1. Appliquer le produit sur les surfaces dures et non poreuses, jusqu'à ce qu'elles soient visiblement mouillées.
2. Essuyer les surfaces pour les sécher ou les laisser sécher à l'air. Répéter l'application chaque semaine ou lorsque la prolifération réapparaît.

Pour une utilisation comme désinfectant muni d'un vaporisateur à pression mécanique :

1. Remplir le réservoir avec la solution.
2. Pré-nettoyer les zones visiblement souillées.
3. Vaporiser le produit sur les surfaces dures et non poreuses, en veillant à ce qu'elles soient mouillées copieusement.
4. Toutes les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 1 minute.
5. Laisser sécher.

Pour une utilisation comme nettoyant/désinfectant dans les zones des établissements alimentaires où on ne manipule pas des aliments :

1. Pré-nettoyer les zones visiblement souillées.
2. Appliquer le produit sur les surfaces dures et non poreuses.
3. Les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 1 minute.
4. Sécher ou rincer les surfaces.

Pour utilisation comme assainisseur sur les surfaces au toucher doux (tissus) :

1. Tenir la bouteille à la verticale des surfaces.
2. Vaporiser jusqu'à ce que la surface du tissu soit visiblement mouillée. Ne pas saturer.
3. Les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 30 secondes.
4. Laisser sécher à l'air.

Pour une utilisation comme nettoyant/désinfectant dans les installations d'abri pour animaux :

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dures et non poreuses suivantes : équipement d'alimentation et d'arrosage, ustensils, instruments, cages, chenils, écuries, etc.

1. Retirer tous les animaux et les aliments pour animaux des locaux, des véhicules de transport d'animaux, des chariots, etc.
2. Enlever toute litière et fumier ou fiente des planchers, des murs et des surfaces des installations occupées ou traversées par des animaux.
3. Vider tous les auges, râteliers et autres appareils d'alimentation et d'approvisionnement en eau.
4. Nettoyer soigneusement toutes les surfaces avec ce produit, puis rincer avec de l'eau potable.
5. Saturer toutes les surfaces dures et non poreuses en pulvérisant la solution de 6 à 8 pouces des surfaces, jusqu'à ce qu'elles soient visiblement mouillées. Pour désinfecter, toutes les surfaces doivent rester visiblement mouillées pendant 1 minute.*
6. Ne pas loger d'animaux ni utiliser le matériel jusqu'à ce que le traitement ait été absorbé, ou ait durci ou séché.
7. Pour désinfecter les râteliers d'alimentation, les auges, les distributeurs automatiques d'aliments, les fontaines ou les appareils d'arrosage, vaporiser les surfaces avec la solution et les laisser visiblement mouillées pendant 1 minute. Rincer à l'eau potable avant de les réutiliser.

Pour une utilisation comme désinfectant pour le lavage des bottes/chaussures :

1. Racler les chaussures ou les bottes imperméables et appliquer ce produit sur les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient visiblement humides.
2. Laisser le produit en contact avec les chaussures ou les bottes pendant 1 minute puis sécher à l'air. Toutes les surfaces traitées qui entrent en contact avec de l'eau potable ou des aliments pour animaux doivent être soigneusement nettoyées avec du savon ou un détergent, puis rincées à l'eau potable avant d'être réutilisées.

Assainissement à large spectre des surfaces environnementales :

1. Pré-nettoyer les zones visiblement souillées.
2. Appliquer le produit sur les surfaces dures et non poreuses.
3. Les laisser mouillées pendant 10 secondes.
4. Laisser sécher à l'air. Aucun rinçage requis. Seules les surfaces en contact avec des produits alimentaires doivent être rincées avec de l'eau potable.

Mises en garde

Éviter (i) le contact avec les yeux; (ii) la contamination de la nourriture lors de l'application et le stockage de ce produit; et (iii) le mélange avec d'autres produits de nettoyage ou de désinfection.

Premiers soins :

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Appeler un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion, appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement et ne pas faire vomir. SI VOUS AVEZ BESOIN DE SOINS MÉDICAUX, N'OUBLIEZ PAS D'APPORTER L'ÉTIQUETTE OU LE NOM DU PRODUIT ET LE DIN.

Entreposage :

Éviter l'entreposage à des températures élevées.

Mise au rebut :

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir et le nettoyage des déversements, s'adresser à l'organisme de réglementation provincial ou au fabricant. Rincer le contenant avec de l'eau. Éliminer le contenant conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. Ne pas réutiliser les contenants.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : Vous devez lire et suivre les instructions sur l'étiquette de notre produit et utiliser le produit pour les applications particulières spécifiées sur l'étiquette du produit. Dans la mesure où le permet la loi en vigueur, Virox Technologies, Inc ne sera pas responsable de tout dommage que ce soit en relation ou autrement en rapport avec tout non-respect de ses instructions ou d'une utilisation de ses produits non spécifiée sur l'étiquette du produit. Les instructions sur l'étiquette du produit ne constituent pas une garantie, expresse ou implicite, et Virox Technologies, Inc. rejette expressément toute garantie implicite, y compris d'aptitude à une tâche particulière. En vertu de la loi en vigueur, certaines des renonciations et limitations de la garantie ci-dessus ou certaines exclusions de responsabilité pour certains types de dommages peuvent ne pas s'appliquer à vous. En pareil cas, notre responsabilité sera limitée à la limite permise par la loi en vigueur.

Pour les brevets pertinents, rendez-vous sur www.virox.com/patents

Accelerated Hydrogen Peroxide® et le dessin sont des marques déposées de Diversey Inc.

* Ventiler les bâtiments et les autres espaces clos.